

Tytuł: Izolowana przetoka przełykowo-tchawicza typu H - trudności diagnostyczne. Opis przypadku / Isolated H-type tracheoesophageal fistula – diagnostic difficulties. Case report.

Słowa kluczowe: ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU PRZETOKA PRZEŁYKOWO-TCHAWICZA TYPU H

Keywords: ESOPHAGEAL ATRESIA H-TYPE TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA

Autorzy:

Lidia Babiak-Choroszczak - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Elżbieta Gawrych - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Justyna Rajewska - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Marek Rybkiewicz - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Janusz Kordowski - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kaja Giżewska-Kacprzak - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Jacek Materny - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie:

Przedłużające się badania diagnostyczne przetoki przełykowo-tchawiczej typu H u noworodka były przyczyną opóźnionego rozpoznania tej wady.

Konieczność wielokrotnego powtarzania badań obrazowych umożliwiło potwierdzenie jej obecności i sprecyzowanie umiejscowienia, co przyczyniło się do właściwego wyboru dostępu operacyjnego.

Abstract:

We present diagnostic challenges in a case of H-type tracheoesophageal fistula in a newborn. Repeated radiological imaging measures confirmed diagnosis with precise position of malformation, what enabled a correct choice of surgical approach.

