

Tytuł: Czynniki predykcyjne mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) w okresie noworodkowym /
Predictive factors of cerebral palsy in the neonatal period

Słowa kluczowe: encefalopatia bilirubinowa encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa
mózgowe porażenie dziecięce zaburzenia biochemiczne zakażenie wewnątrzmaciczne wcześniak

Keywords: bilirubin encephalopathy biochemical disturbances cerebral palsy hyperglycemia
hypoxic-ischemic encephalopathy intrauterine infection premature infant

Autorzy:

prof. dr hab. Maria Katarzyna Kownacka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie:

Prawidłowy rozwój psychoruchowy jest wykładnikiem przebiegu ciąży, porodu i okresu noworodkowego, stanowiąc równocześnie wypadkową oddziaływania wielu czynników, w tym przede wszystkim genetycznych i środowiskowych. Zaburzenia rozwoju przybierają mniej lub bardziej nasiloną postać, z których najcięższą jest mózgowe porażenie dziecięce (MPD). Jest to wieloetiologiczny zespół manifestujący się najczęściej porażeniami spastycznymi lub wiotkimi. Czynniki etiologiczne MPD są bardzo złożone, najczęściej wewnątrzmaciczne, a należą do nich:

- niedotlenienie wewnątrzmaciczne (pH z krwi pępowinowej < 7,10; BE < -12 mmol/l);
- niedojrzałość – noworodki z małą i ekstremalnie małą masą ciała;
- zakażenie wewnątrzmaciczne;
- cięższe wielopłodowe; nn hipoglikemia i hiperglikemia.

Abstract:

Pregnancy, labour and the neonatal period are predictors of neuro-developmental outcome. Genetic and environmental factors also seem to play a crucial role in this process. Developmental disorders present with a wide spectrum of clinical syndromes, out of which cerebral palsy (CP) is the most common. CP is a multifactorial disease, which presents typically with spastic or flaccid palsy. Etiological factors of CP are very complex, but the most frequent intra uterine predictors are as follows:

- intrauterine asphyxia (cord blood pH < 7.10; BE < -12 mmol/L);
- prematurity – neonates born with low or extremely low birth weight; nn multiple pregnancies;
- hypoglycemia;
- hypercapnia and hypocapnia.