

Tytuł: Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby (FNH) jako problem diagnostyczno-terapeutyczny /
Focal liver nodular hyperplasia (FNH) as a diagnostic and therapeutic issue

Słowa kluczowe: OGNISKOWY ROZROST GUZKOWY WĄTROBY BIOPSJA WĄTROBY CHOROBY
WĄTROBY DIAGNOSTYKA OGNISKOWEGO ROZROSTU GUZKOWEGO WĄTROBY TECHNIKI
OBRAZUJĄCE

Keywords: FOCAL NODULAR HYPERPLASIA DIAGNOSIS OF FOCAL NODULAR HYPERPLASIA
IMAGING TECHNIQUES LIVER BIOPSY LIVER DISEASES

Autorzy:

Wojciech Grabosz - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Magdalena Świtlicka-Zalewska - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w
Gdańsku

Anna Kowalczyk - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Magdalena Bona - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Anna Kałużńska - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Anna Liberek - Oddział Pediatriczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku Zakład
Pielęgniarstwa Ogólnego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie:

Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby (ang. focal nodular hyperplasia, FNH) ze względu na bezobjawowy przebieg jest zazwyczaj wykrywany przypadkowo. Po ustaleniu rozpoznania najczęściej zaleca się okresową kontrolę radiologiczną. Podejmując decyzję o leczeniu chirurgicznym, zawsze należy rozważyć korzyści i ryzyko powikłań związanych z lokalizacją zmiany.

Abstract:

Focal liver nodular hyperplasia (FNH – focal nodular hyperplasia), due to its asymptomatic course, is usually a randomly detected lesion. Once the diagnosis is made, periodic radiological check-ups are usually recommended for further management. When deciding on surgical treatment, the benefits and risks of complications associated with the localization of the lesion should always be considered.