

Tytuł: Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w materiale IP-CZD / Bleeding from the upper gastrointestinal tract in children hospitalized in the Children's Memorial Health Institute

Słowa kluczowe: dzieci górny odcinek przewodu pokarmowego żylaki przełyku krwawienie

Keywords: children esophageal varices upper gastrointestinal tract hemorrhage

Autorzy:

dr hab. Piotr Socha - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP-CZD

dr hab. Marek Woynarowski - Grupa ds. badań klinicznych w populacji pediatrycznej
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (www.gcppl.org.pl)

Danuta Celińska-Cedro - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Mikołaj Teisseyre - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Krystyna Grzybowska - Zakład Żywienia Klinicznego Katedry i Kliniki Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mgr Joanna Ryżko - Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie:

Praca stanowi analizę przyczyn krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (gopp) u dzieci, ich przebiegu klinicznego i postępowania terapeutycznego. Analizie poddano grupę 352 dzieci (150 dziewczynek i 202 chłopców) w wieku od 1 miesiąca do 17 lat, hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP CZD z powodu krwawień z gopp w latach 1980–2000. Ocenę przeprowadzono metodą retrospektywną w oparciu o dokumentację kliniczną. Wykazano, że najliczniejszą grupę wiekową wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu krwawień z gopp stanowiły dzieci w wieku szkolnym (31,8%), a najmniej liczna – niemowlęta (8,8%) i dzieci w okresie młodzieńczym (10%). Dominującą przyczyną krwawienia były krwotoki z żylaków przełyku (71,8%), natomiast nawrotowość krwawień sięgała prawie 50%. Najczęściej do szpitala przyjmowane były dzieci w stanie umiarkowanym (56,8%), a najrzadziej – w lekkim (18,4%). Ponadto stwierdzono, że w grupach dzieci starszych (od wieku przedszkolnego do młodzieńczego) krwawienia zostały opalone w ciągu 24 godzin. Natomiast w młodszych grupach wiekowych leczenie musiało być kontynuowane przez kilka dni.

Abstract:

Causes of upper gastrointestinal bleeding in children are analyzed in concern of clinical course and therapeutic approach. 352 children (150 girls) aged 1 month to 17 years admitted to the Department of Gastroenterology, Hepatology and Immunology of the Children's Memorial Health Institute for upper gastrointestinal bleeding from 1980 to 2000 were included into the study. The assessment was based on retrospective analysis of patients' documentation. The majority of patients presenting with gastrointestinal bleeding were school children (31.8%), infants (8.8%) and teenagers (10%) presented rarely to the clinic. The most common cause of bleeding were oesophageal varices (71.8%). Recurrent bleeding was very common (50%). Most of the children were in intermediate general condition (56.8%) at the moment of admission. In older children (preschool, school and teenagers) bleeding was successfully managed within 24 h. In younger ages treatment had to be continued for several days.