

Tytuł: Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki. / Pancreatic exocrine insufficiency.

Słowa kluczowe: dzieci substytucyjna terapia enzymatyczna niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

Keywords: children pancreatic enzyme therapy pancreatic exocrine insufficiency

Autorzy:

Grzegorz Oracz - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie:

Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki może być zarówno konsekwencją uszkodzenia miąższu trzustki, utrudnionego odpływu soku trzustkowego, zmniejszonej produkcji pobudzających wydzielanie enterohormonów, jak i inaktywacji enzymów trzustkowych. Kluczowe znaczenie w leczeniu przewlekłej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki mają enzymy trzustkowe.

Abstract:

Pancreatic exocrine insufficiency is a consequence of diseases leading to a loss of pancreatic parenchyma, obstruction of the pancreatic duct, decreased pancreatic stimulation, or inactivation of pancreatic enzymes. Therapy for pancreatic exocrine insufficiency is based on the oral administration of pancreatic enzymes.