

Tytuł: Gastrostomia odżywcza a refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci / Percutaneous endoscopic gastrostomy and gastroesophageal reflux in children

Słowa kluczowe: DZIECI REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY GASTROSTOMIA ODŻYWCZA

Keywords: CHILDREN GASTROESOPHAGEAL REFLUX PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY

Autorzy:

dr Jarosław Kierkuś - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Anna Wiernicka - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Michał Szczepański - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Małgorzata Matuszczyk - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie:

Przezskórna endoskopowa gastrostomia odżywcza (ang. percutaneous endoscopic gastrostomy - PEG) jest metodą powszechnie stosowaną w długoterminowym leczeniu żywieniowym u dzieci. W prezentowanym artykule podjęto próbę przedstawienia badań oceniających korelację pomiędzy gastrostomią odżywczą a refluksem żołądkowo-przełykowym (ang. gastroesophageal reflux - GER) u pacjentów pediatrycznych. Na dzień dzisiejszy niestety nie ma dobrej jakości badań dostarczających dowodów na to aby założenie PEG wpływało ilościowo czy jakościowo na refluks żołądkowo--przełykowy u dzieci.

Abstract:

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a widely used method for long-term nutritional treatment in children. The presented article is an attempt to describe studies evaluating the correlation between gastrostomy and gastroesophageal reflux (GER) in pediatric patients. Unfortunately high-quality evidence does not currently exist to provide evidence that PEG insertion quantitatively or qualitatively influence the gastroesophageal reflux in children.