

Tytuł: Choroba zezowa u dzieci / Children strabismus

Słowa kluczowe: NIEDOWIDZENIE OBNIŻENIE OSTROŚCI WZROKU WIDZENIE OBUOCZNE ZEZ

Keywords: AMBLYOPIA BINOCULAR VISION REDUCTION IN VISUAL ACUITY STRABISMUS

Autorzy:

Beata Kępa - Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Katarzyna Kotulska-Józwiak - Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie:

Zez jest przyczyną zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci. Etiologia występowania zeza jest zróżnicowana i obejmuje wady refrakcji, czynniki genetyczne, jak również zmiany rozwojowe, zapalne, pourazowe i nowotworowe dotyczące narządu wzroku, związanych z nim struktur oraz układu nerwowego. Leczenie zeza należy rozpocząć jak najwcześniej celem uniknięcia trwałego obniżenia ostrości wzroku oraz uzyskania prawidłowego widzenia obuocznego. W razie nieskuteczności leczenia zachowawczego należy zastosować leczenie operacyjne.

Abstract:

Strabismus is the cause of binocular vision disorders in children. The etiology of strabismus is varied and main reasons of the occurring are refractive errors, genetic factors, developmental changes, inflammatory and traumatic disorders, ocular tumors and associated abnormality of the nervous system. Treatment of strabismus should begin as early as possible to avoid permanent reduction in visual acuity and to obtain proper binocular vision. After failure of conservative treatment, surgical treatment should be removed.