

Tytuł: Zespół odstawienia u noworodka – matka uzależniona od narkotyków / Neonatal abstinence syndrome – mother addicted to narcotics

Słowa kluczowe: SKALA FINNEGAN UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW ZESPÓŁ ODSTAWIENIA U NOWORODKA

Keywords: FINNEGAN SCORE NARCOTICS ADDICTION NEONATAL ABSTINENCE SYNDROME

Autorzy:

Marek Szczepański - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wojciech Szczepański - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie:

Dziecko matki zażywającej w trakcie ciąży narkotyki, leki lub inne substancje jest narażone po porodzie na wystąpienie zespołu objawów związanych z przerwaniem ekspozycji na te substancje. Objawy te łączone są w jednostkę kliniczną zwaną zespołem odstawienia u noworodka. Jego objawy są różnorodne. Mogą sugerować inne, niebezpieczne dla życia noworodka stany, których terapia jest zgoła odmienna. Dlatego warto pamiętać o możliwości wystąpienia zespołu odstawienia u noworodka i wiedzieć, jak postępować w takim przypadku. W poniższym artykule omówiono postępowanie z dzieckiem matki uzależnionej od narkotyków.

Abstract:

Children whose mothers used pharmaceutical, illicit drugs or other substances during the pregnancy may develop withdrawal symptoms after birth, as the substances are no longer administered. These symptoms are jointly classified as the so-called neonatal abstinence syndrome (NAS). NAS symptoms are diverse and may be suggestive of other life-threatening conditions with different treatment protocols. Therefore, caregivers should remember about the possibility of infants developing NAS and they should know the procedures recommended in such cases. The paper discusses management strategies for children of drug-addicted mothers.